

NOTICE (FR)

Composants

Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques.

Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques.

Utilisation prévue

Mélange à utiliser pour les tatouages ou le maquillage permanent. Le pigment s'implante dans le derme (maquillage permanent) à l'aide d'un module d'aiguilles et d'un dispositif de pigmentation.

Les domaines d'application les plus courants de la pigmentation sont les suivants :

- Dessin ou nuance des sourcils
- Tracé d'eyeliner
- Nuance ou contours des lèvres
- Tatouages corporels

Contre-indications

Dans les cas suivants, aucune pigmentation ne doit être entreprise :

- Hémophilie ou autres troubles de la coagulation
- Prise d'anticoagulants (par ex. acide salicylique, héparine, aspirine ou acide salicylique)
- Diabète non contrôlé
- Toute forme d'acné active dans la zone de traitement
- Dermatoses (par ex. tumeurs cutanées, chéloïdes ou tendance extrême aux chéloïdes, kératose solaire, verrues et/ou grains de beauté) dans la zone de traitement
- Plaies ouvertes et/ou eczéma et/ou éruptions cutanées dans la zone de traitement
- Cicatrices dans la zone de traitement

- Infections systémiques et maladies infectieuses (par ex., hépatite de type A, B, C, D, E ou F, infection par VIH) ou infections locales sévères de la peau (par ex., herpès, rosacée)
- Pour la pigmentation des paupières : conjonctivite
- Pendant une chimiothérapie, radiothérapie ou un traitement à hautes doses aux corticostéroïdes (recommandation : à partir de 4 semaines avant le début jusqu'à 4 semaines après la fin du traitement)
- Jusqu'à douze mois après une opération esthétique dans la zone de traitement
- Jusqu'à six mois après des injections de produits de comblement dans la zone de traitement
- Allergie aux anesthésiques topiques (anesthésie locale)
- Personnes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue
- Grossesse et allaitement

Le traitement des muqueuses et globes oculaires est strictement interdit.

S'il existe le moindre doute quant à la sécurité du client, il convient de ne pas commencer le traitement ou de l'interrompre immédiatement.

Le traitement doit être interrompu immédiatement en cas de :

- En cas de sensibilité excessive à la douleur
- Perte de connaissance / vertiges
- Sécrétion excessive d'exsudats

Les zones cutanées qui viennent d'être traitées doivent généralement être protégées des UV et des rayons du soleil.

Dans de rares cas, l'introduction d'encre de pigmentation peut provoquer les problèmes suivants :

- Différences de teintes
- Dépigmentation
- Réactions allergiques à d'autres composants de l'encre pigmentée aseptique

Utilisation des pigments

Avant d'utiliser des pigments, veuillez bien lire les indications suivantes :

- Les pigments ne peuvent être utilisés que par du personnel qualifié, médical ou formé à la pigmentation.

- Les pigments ne peuvent être utilisés qu'aux fins décrites au point « Utilisation prévue ».
- **Bien agiter avant utilisation.**
- Ne pas mélanger avec des produits d'autres fabricants.
- Effectuer un test de tolérance avant toute utilisation. *)
- Éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau en cas de contact avec les yeux.
- Informer les clients des risques éventuels. Si vous avez des raisons de soupçonner que le pigment n'est pas en parfait état (dommages subis lors du transport, mauvais stockage...), ne l'utilisez pas.
- Toutes les règles d'hygiène spécifiques à chaque pays doivent être respectées.
- Veiller à ce que le reste de pigment dans le flacon ne soit pas contaminé pendant la manipulation.
- Ne pas remettre de pigment dans le flacon après l'en avoir sorti.
- Conserver les flacons de pigments dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.
- Ne pas exposer les flacons à la lumière du soleil pendant une période prolongée.
- Pour nettoyer les flacons, utiliser uniquement un chiffon imbibé de désinfectant.
- Ne pas boire ou inhaler le pigment.
- Utiliser le pigment avant la date de péremption indiquée sur l'étiquette du produit.
- Conserver les pigments hors de portée des enfants.
- Jeter les résidus avec les ordures ménagères.

* Pour le test de tolérance, appliquer une petite quantité de pigment avec une aiguille stérile sur la peau sensible derrière l'oreille. Attendre 72 heures pour s'assurer que le produit ne déclenche aucune réaction allergique. Effectuer ensuite le même test sur la zone de la peau à traiter. Ce test doit être effectué pour chaque pigment à utiliser.

Risques

- Le pigment utilisé reste dans la peau et ne peut donc pas être retiré.
- Malgré l'excellente stabilité des pigments de couleur utilisés, ils peuvent s'estomper ou changer après utilisation.
- On ne peut garantir que le pigment perdra complètement sa couleur.
- En fonction de l'application par un personnel qualifié et l'état de la peau, il peut arriver que les pigments de couleur se déposent de manière irrégulière.
- Même si aucun effet secondaire n'est connu à ce jour, des réactions allergiques indésirables peuvent survenir.

- Il se peut aussi que les pigments ne puissent pas être enlevés des vêtements (ou d'autres matériaux).